

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Influcid tabletes

Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3,
Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1

Homeopātiskās zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiat farmaceutam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Influcid un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas
3. Kā lietot Influcid
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Influcid
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Influcid un kādam nolūkam to lieto

Influcid ir homeopātiskās zāles saaukstēšanās un drudža, piemēram, gripai līdzīgā stāvokļa, ārstēšanai.

2. Kas Jums jāzina pirms Influcid lietošanas

Nelietojiet Influcid šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja drudzis saglabājas ilgāk par 3 dienām vai paaugstinās virs 39°C, vai ja sūdzības ir neskaidras vai nepāriet, konsultējieties ar ārstu, jo var būt saistītas slimības, kam nepieciešama medicīniska izmeklēšana.

Bērni

Influcid nav ieteicams bērniem līdz 1 gada vecumam, jo nav pietiekamu datu par šo zāļu lietošanu zīdaiņiem.

Citas zāles un Influcid

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Influcid kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu

Homeopātisko zāļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi, kā arī stimulatoru lietošana, vai alkohols un tabaka.

Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Influcid neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Influcid satur laktozi (piena cukuru) un kviešu cieti

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šīs zāles ir piemērotas lietošanai pacientiem ar celiakiju, bet tās nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīgu no celiakijas).

3. Kā lietot Influcid

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie: *akūtas saslimšanas gadījumā* jālieto 1 tablete katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. *Tālākai ārstēšanai* lieto 1–2 tabletes 3 reizes dienā.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērniem līdz 12 gadu vecumam: *akūtas saslimšanas gadījumā* jālieto 1 tablete ik pēc 2 stundām (ne vairāk kā 8 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. *Tālākai ārstēšanai* lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Pusaudžiem no 12 gadiem: *akūtas saslimšanas gadījumā* jālieto 1 tablete katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. *Tālākai ārstēšanai* lieto 1–2 tabletes 3 reizes dienā.

Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē. Maziem bērniem tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā.

Ja esat lietojis Influcid vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja esat aizmirsis lietot Influcid

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Influcid

Pārtraucot Influcid lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos var izpausties paaugstinātas jutības reakcijas, tādas kā ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos konsultējieties ar savu ārstu.

Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā stāvokļa pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Influcid lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Influcid

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un iepakojuma pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Influcid satur

- Viena tablete satur šādas aktīvās vielas: Aconitum D3 25 mg, Gelsemium D3 25 mg, Ipecacuanha D3 25 mg, Phosphorus D5 25 mg, Bryonia D2 25 mg, Eupatorium perfoliatum D1 25 mg.
- Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts.

Influcid ārējais izskats un iepakojums

Influcid ir baltas vai gandrīz baltas, reizēm nedaudz plankumainas, plakanas tabletes.

20 tabletes blisteros, salokāmā kartona kastītē ar pievienotu lietošanas instrukciju.

Iepakojumā 40 vai 60 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alpen Pharma GmbH
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija
tel +49 7243 200 49 20
e-pasts info.germany@alpenpharma.com

Ražotājs

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2023