

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

Dentokind tabletes

Belladonna D6, Chamomilla D6, Ferrum phosphoricum D6, Hepar sulfuris D12, Pulsatilla D6

Homeopātiskās zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.
- Ja Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk pēc 7 dienām, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Dentokind un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms Dentokind lietošanas
3. Kā lietot Dentokind
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Dentokind
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Dentokind un kādam nolūkam to lieto

Dentokind ir homeopātiskās zāles zīdaiņiem un maziem bērniem, kas zobu šķilšanās laikā atvieglo tādas sūdzības kā uzbudināmība, nemiers, ausu sāpes, sāpīgas smaganas, neliels drudzis un šķidrāka vēdera izeja nekā parasti.

2. Kas Jums jāzina pirms Dentokind lietošanas

Nelietojiet Dentokind šādos gadījumos:

- ja Jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kādu no šo zāļu aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

- ja ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu;
- ja Jums šķiet, ka Dentokind iedarbība ir pārāk vāja, vai bērnam rodas citas negaidītas sūdzības, lūdz, konsultējieties ar ārstu.

Citas zāles un Dentokind

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, ir lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

Dentokind kopā ar uzturu un dzērieniem

Dentokind lietošana kopā ar ēdienu nav ieteicama. Ideālā gadījumā tabletes jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Šīs zāles ir paredzētas bērniem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles ir paredzētas bērniem.

Dentokind satur laktozi (piena cukuru)

Ja ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Dentokind

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Bērniem līdz 1 gada vecumam

Akūtu simptomu gadījumā nozīmē 1 tablete katru stundu, bet ne vairāk kā 6 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, lieto 1 tableti 3 reizes dienā.

Bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam

Akūtu simptomu gadījumā nozīmē 2 tabletes katru stundu, bet ne vairāk kā 12 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, lieto 2 tabletes 3 reizes dienā.

Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 3 gadu vecumam tabletes var izšķīdināt nelielā daudzumā ūdens.

Ja Jūsu bērna simptomi neuzlabojas pēc 7 dienām vai parādās jauni simptomi, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Dentokind vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja esat aizmirsis lietot Dentokind

Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Dentokind

Pārtraucot Dentokind lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Nav zināmas blakusparādības, kuras izraisa Dentokind.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā stāvokļa pasliktināšanās). Šādos gadījumos pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

5. Kā uzglabāt Dentokind

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un etiķetes pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas ir 12 mēneši.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiēt farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Dentokind satur

1 tablete satur:

- Aktīvās vielas ir: Belladonna D6 15 mg, Chamomilla D6 15 mg, Ferrum phosphoricum D6 15 mg, Hepar sulfuris D12 15 mg, Pulsatilla D6 15 mg.
- Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, talks, laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Dentokind ārējais izskats un iepakojuma saturs

Tabletes ir baltas vai gandrīz baltas ar plakanu virsmu un noslīpinātām malām.

Tabletes iepakotas brūnā stikla pudelītē, kura satur 150 tabletes.

30 tabletes, kas iepakotas blisterī, 1 vai 2 blisteri kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alpen Pharma GmbH
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija
tel +49 7243 200 49 20
e-pasts info.germany@alpenpharma.com

Ražotājs

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2024.